

Ugni blanc n°6  
Vas 8533

Ugni blanc U6



\*74MTP13\*



SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

74Mtp13

Vass2R10s061-065

Ugni blanc n°6  
Clas 2 R-10-A 61-65  
Blanche + 8A4

FH

Ugni blanc n°6  
Clas 2 R-10-A 61-65



















Désignation : Ugni blanc n°6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

1- 2  
2- 1  
3- 0  
4- 6  
5- 1

17-9-56 +4

3° époque

Désignation : Ugni blanc n°6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 18

28

Sorte [3

415

54

le 11-9-1957 (Res) +4

Désignation : Ugni blanc n°6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 13

2 11

3

4 7

5 2

le 31-8-59  
Pozo

+3

Année 1956 Ugni blanc n° 6  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 8. S. 33.

	Nombre total	D A T E S							
		18	21	23	27	30	31	3	
1	10	0	0	0	0	6	6	6	
2	10	0	0	0	1	4	4	4	
<del>3</del>									
4	8	0	0	0	1	3	5	6	
5	4	0	0	0	0	1	7	2	

III 31-3-56 D<sub>1</sub>  
 +5

Année 1957 Ugni blanc n° 6  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8. S. 33.

	Nombre total	D A T E S							
		16-3	19/3						
1	10	1	7	x					
2	8	4	8	x					
<del>3</del>									
4	10	0	5	x					
5	2	0	0						

III<sup>e</sup> D e 18-3-57  
 +9



Ugni blanc n° 6

Année 1958.

N° ..... Planche ..... Côté 8833

	Nombre total	D A T E S									
		1-4	3-4								
1	8	2	3								
2	8	2	4								
<del>3</del>											
4	10	3	6								
5	4	2	3								

DE 3-4-58  
L<sup>e</sup> +11

Ugni blanc n° 6

Année 1959

N° ..... Planche 8833 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		27.3	31/3								
1	10	2	7								
2	10	4	8								
<del>3</del>											
4	9	4	8								
5	5	2	5								

D le 29-3-59  
+13

Année : 1965

Emplacement .. V..18.A.4..... Désignation .. Vigne. Blane. N°6.....

STATIST									
	Nombre total								
		14	5.4						
1	4	0	3 x						
2	5	2	3 x						
3	4	0	2 x						
4	3	2	2 x						
5	4	0	2						

D 5.4 65 x +8

ANNEE

1987

NOM

Vigne Blane

EMPLACEMENT

V 18 A 4 2 R 10 A 61-65

13

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						10.6	14.6	18.6	3.8	6.8	10.8	14.9
<del>2</del>										+2		+4
<del>3</del>												
<del>4</del>												
5 f												

14.6

+7

Lat 1/2 cinge  
Vigne 4



ANNEE 1988

13

NOM *Algini bl*

T

EMPLACEMENT *J 18 A 4, 2 R 10 2, 61.65*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	1.4	15.4	9	9							
2												
3						6.6	8.6	12.6	4.8	8.8	14.8	19.9
4												
5	1											
		Pourriture :		1	Port :		mi'auge	Vigueur :		4		
							8.6			+3		+5
							+8					

ANNEE 1989

Témoin

NOM *Algini bl*  
13

EMPLACEMENT *J 18 A 4*  
*2 R 10 2 61.65*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	23.3	31.3	16	16	23.5	2.6	5.6	1.8	5.8	10.8	11.9
X							+6			+2		+5
X												
X												
X												
Mill.		Pourriture :			Port :		mi'auge	Vigueur :		4.5		



ANNEE 1990

NOM UGNI BLANC

EMPLACEMENT

J 18 A4

007413

2 R 10 A 61.65

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12	22.3	29.3	17	14							
2						28.5	32.5	31.5	30.7	4.8	8.8	8.9.90
3							+10					
4										+3		+4
5												
		D 29.3.90 (+20)										

Pourriture :

Mill. :

Port : 1/2 cing

Vigueur : 4.5

ANNEE 1991

NOM

Ugni bl  
007413

2 R 10 A 61.65

EMPLACEMENT

J 18 A4

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	29.3	8.4	11								
2						8.6	12.6	17.6	10.8	13.8	19.8	12.0.9
3							+12					
4										+3		+4
5												
		D 8.4.91 +21			11							

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :



ANNEE 1992

2 Rg 10 D 61-65-

NOM

Ugni bl

EMPLACEMENT

V 18 A 4

007413

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	23.3	6.4	17	17	28.5	31.5	3.6	30.8	30.8	17.8	7.9
2							+9			+3		+4
3												
4												
5												

D &amp; 64.92

Pourriture : +17

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1993

NOM

Ugni B

EMPLACEMENT

V. 18 A 4

007413

2 R 10 D 61.65

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	14	1.4	5.4			3.6	5.6	7.6	9.8	12.8	16.8	13.9
2							+6			+3		+4
3												
4												
5												

D &amp; 54.93

+16

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N

Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :



Témoin

ANNEE: 1998  
 NOM: Alqui Bl  
 0074.13

EMPLACEMENT: 2 Ros 61-65

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	30.3	3.4	4	13	27.5	2.6	8.6	27.7	04-08	408	3.9
2	2	30.3	6.4	4			+3			+3		+3
3	6	30.4	6.4	4								
4	6	30.3	3.4	9		Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - H - C Four :                      Mill : Baie : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :                      Vigueur :						
5	4	30.3	6.4	7								
	22			28								
		D. de 4.4.98 (+22)										

Témoin

ANNEE: 1999  
 NOM: Alqui blanc  
 (0074)13

EMPLACEMENT: 2 Ros 61-65

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	19.3	23.3	5	10	31.5	3.6	8-6	3.8	10-8	178	22.9
2	3		30.3	2			+10			+4		+6
3	6	30.3	5.4	mangée		Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - H - C Four :                      Mill : Baie : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :                      Vigueur :						
4	8	30.3	2.4	12								
5	4	30.3	2.4	mangée								
	17			18								
		D. de 21.3.99 (+15)										

CET



Désignation : *Ugni Blanc no 6*

VASSAL                      Planche 8    côté S    N° 33    Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9)

42 ~~33~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~34~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 ~~35~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 3-5-54  
Rouquin 18-5-56.*

N° ordre

Désignation : *azui blanc n° 6*

VASSAL Planche 8 côté S N° 33 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

28-5-54 Delorme



N° ordre

Désignation : *Ugni Plane no 6*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *33* souche *1* (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 18-6-54*

N° ordre

Désignation *Ugni blanc nob*

VASSAL planche 8 côté S N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -  
plissée au point pétioleaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - <sup>ou</sup> vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (2)

39 glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.

40 aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalément 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Bernard 27-7-56.  
Broch 22-9-56  
Tiner 26-9-56.



N° d'ordre

Désignation *liqui blanc n° 6*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 33 souche 1 ~~2~~ 3 ~~4~~ 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ~~1~~ - Moyenne ~~2~~ - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ~~5~~ - Compacte ~~6~~.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ~~8~~ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé ~~1~~ - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ~~5~~.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ~~3~~ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ~~7~~ - irrégulière ~~8~~.  
27 - de couleur blanc ~~1~~ - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ~~8~~ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ~~1~~ - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ~~1~~ - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ~~3~~ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ~~7~~.  
- à jus incolore ~~1~~ - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne ~~4~~ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ~~7~~ - molle 8.  
- à saveur neutre ~~1~~ - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen ~~2~~ - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ~~4~~ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ~~7~~ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ~~1~~ - peu apparent ~~2~~.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen ~~5~~ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ~~9~~.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ~~2~~.

Bret 30 AOUT 1955

8333 Ugni blanc n°6

✓

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.



N° d'ordre : . 00 7.413. . . Designation: . Ugni blanc n° 6. .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 8 S. 33 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③  
 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - ② - ③  
 10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - ②  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - ③.  
 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - ③  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - ③  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - ② - ③  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
 Forme : ④ - ⑤  
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Tinet 57



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Ugni blanc

Emplacement : **Vass2R10s061-065**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

		RESISTANCE			
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 <i>de RGR</i>	<del>F</del> 2		<del>2/3</del> 11/4	<del>1</del>	
2 <i>de RGR</i>	<del>4</del> 6		12/4	3	<i>on Visual</i>
3	7	3/4	9/4	9	
4	8	5/4	10/4	3	
5	<del>4</del> 6 6	3/4	11/4	4	
Moyenne	25		11/04 +14	19	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoulement (oiv 306)
26/5	31/5 +7		23/07	30.07 +2	24/09 +4	

Dates	10/8	17/8	24/08	31/8
IR	17°	17,2 - 17,8 End A	enroulé sur 1er A	roulé sur papier BT
Valeur papier PH				moi! A>

Remarque: 15 esc. entroi de la défender 17/09

4/09 m low A

8/09 lig A



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014      Observateur : B. Genna  
Code cépage : Ugni Blanc      Code introduction : 13  
Nom introduction :      Emplacement : 2 R 10 56 A. 65

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet
VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne		27/03	01/04 +15		

Date		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	floraison moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
26/05	29/05 +8		23/07	29/07 +2	16/09/14 +3	

SUIVI DE MATURE										
Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09	16/09	
IR	<13°5	17°6	17°7	18°7	19°4	20°8	21°45	21°3	22°	
Valeur papier PH										

Remarque :



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Ugni blanc

Emplacement : Vass2R10s061-065

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

		RÉSISTANCE			
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	(2)		24/3 do fct		
2	10	29/3	5/4	11	
3	12	1/4	9/4	13	
4	9	2/3	2/4	12	
5	12	29/3	6/4	17	
Moyenne	1,5		6/4 +13	53	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
06-06	03-06 +4		31/07	06/08 +2	12.09 0	

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	18	19.5	21	22
Valeur papier PH				

Remarque : 4 à 22



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012  
Code introduction : 74Mtp13  
Nom introduction : Ugni blanc  
Observateur :  
Emplacement : Vass2R10s061-065

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	SA Reliance F				
2	10	31/3	5/4	11	
3	13	31/3	12/4 Sdib 6/4 ~ 7m 9/4 Pervale m	12	
4	13	30/3	5/4	12	
5	12	31/3	6/4	12	
Moyenne	48		7/4 +10	67	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	1/06 +3		31.07	08.08 +2	13.09	

Pas enroulé 17.05

SUIVI DE MATURITE								
Dates	28.06	06.09						
IR	triste	Acide						
Valeur papier PH								

Remarque : 26.07. bonne DV. charge + importante.



(stades débourrement : floraison : véraison : maturité : aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Ugni blanc

Code introduction : 74Mtp13

Nom introduction : Ugni blanc U6

Emplacement : Vass2R10s061-065

## PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

## VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

## RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	19/3	30/3	6	
2	7	30/3	30/3	13	
3	9	25/3	25/3	18	
4	8	25/3	25/3	8	
Moyenne	33	28/3	28/3	45	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15-05	19-05 <sub>+5</sub>		20-07-11	28-07 <sub>+2</sub>	9-09 <sub>+3</sub>	

12-05 14 JUVENILE (54±15/3) (sur arbres fleuris) SUIVI DE MATURETE mousson dans champs de Coléoptère

Dates	18.08.	25-08	31-08-			
IR	20,2-20 192 Pine Acids	22-20.16	20,4-19,8. leucine A)			
Valeur papier PH		A>>				

Remarque: 21.06.11 RAS Vézère + le 30.06. - DV, 06.07 (tout début?) mer, river le 12-07 bords très durs.



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010  
Code cépage : 74  
Code introduction : 13  
Nom introduction : Ugni blanc  
Observateur :  
Emplacement : Vass2R10s061-065

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	2/4	9/4	14	
2	10	2/4	8/4	14	
3	9	2/4	7/04	10	
4	8	2/4	7/04	20	
5	10	2/4	7/04		
Moyenne	37		8/4 + 10	58	16

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01.06	03.06		26.07	2.08	2/9	

+1

+2

+1



T

**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2009** Observateur :  
Code cépage : 74 Code introduction : 13  
Nom introduction : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s061-065**

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	13/3	23/3	2	
2	7	26/3	30/3	6	
3	9	26/3	2/4	7	
4	11	26/3	30/3	12	
5	10	30/3	2/4	7	
Moyenne	43		30/3 +13	34	8

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	28/5		27/7	30/7 +2	1/9 +2	

- 1  
20h 09 baies s'attendrissent (27/2 Novaris)  
(15,4 - 18,6 - 19,2 Dn rods) 18/8.  
21/8 - 22, 16 juv A.  
Quen Dn.  
1/9 - 20 - 18 - 12,8 encore A.  
mais bien pétérisé



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 Phéno Code intro 13 Observateur :  
CodeIntro : 74Mtp13 Nom Var : Ugni blanc  
Nom introduction : Ugni blanc U6 Emplacement : Vass2R10s061-065

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	20/3	26/3	4	
2	6	18/3	25/3	6	
3	11	28/3	31/03	10	
4	10	20/3	28/3	7	
5	15	28/3	31/03	8	
Moyenne	48		28/3	35	7

+18

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	31/5		31/07	7/08	3/09	

+7

X +2

+3 17.20.  
(13 + 17.20 = 30.20 = 30.20)



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007  
Code cépage : 0074  
Code introduction : 13  
Nom introduction : Ugni blanc  
Observateur :  
Emplacement : 02R10S061.065

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	20/3	22/3	4	
2	7	15/3	22/3	8	
3	13	15/3	26/3	14	
4	10	20/3	22/3	12	
5	14	20/3	22/3	15	
Moyenne	50		23/3	53	11

+14

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)+3	Date de maturité (oiv 304)+3	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	24/5		26/07	1/08	8/9	

+15

100 enrou 12/7  
DV

14/8 = A. IR = 15.  
20/8 = Proche DM



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006  
Code cépage : 0074      Code introduction : 13  
Nom introduction : Ugni blanc      Emplacement : 02R10S061.065

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Relever <sup>comptage des grappes</sup> dès le 18/06

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	27/3	31/3	0	
2	5	27/3	2/4	3	
3	11	31/3	6/4 3 déb le 3/4	9	
4	10	31/3	3/4	10	
5	11	159 grappe 31/3 3/4	6/4	9	
Moyenne	47		3/4	31	7

+7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25/5	29/5		26/7	4/8 +2	6/9 +4	

+3

21/8 un ju A  
30/8 un ju A



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005  
Code cépage : 74      Code introduction : 13  
Nom introduction : Ugni blanc  
Observateur :  
Emplacement : 02R10S061.065

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :      Grappes comme celles du 18/04/07

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	08/04	12/04	1	
2	5		14/04	6	
3	14	08/04	15/04	17	
4	10		15/04	13	
5	13	12/04	19/04	16	
Moyenne	49		15/04/05	53	11

+13

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
1/6	6/6		1/08	8/08	12/9	

+6

+2

6/9 : A

Fv 19/08

12/9 : en creux petit pin A.  
IR 18.



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004      Observateur :  
 Code cépage : 74      Code introduction : 13  
 Nom introduction : Magni-Blanc      Emplacement : 2A 100 61-65

*Phénologie*

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
 oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
 oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
 oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
 oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
 oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
 oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	25/03	1/04	3	
2	5	25/03	1/04	6	
3	6	4/04	8/04	8	
4	6	1/04	4/04	8	
5	7	1/04	4/04	6	
Moyenne	30		3-4-04	31	10

+ 13

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
4/06	7/06		2/8	12/8	06/09	

+ 4

+ 2

+ 2



T

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003  
Code cépage : 74      Code clone : 13  
Nom cépage : Mgri-Blanc

Observateur :  
Emplacement : 2R 10 A 61-65

Phénologie

- > oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	1.4	4.4	4	
2	4	12.4	15.4	3	
3	6	7.4	10.4	10	
4	8	8.3	4.4	7	
5	6	7.4	10.4	13	
Moyenne	30		8.4.03	37	12

+15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
	9/106		25/7	5/8	1/9		

+7

+3

+3



Telmoir

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtémeant)

Année : 2002  
Code cépage : 0074 Code clone : 13  
Nom cépage : Ugni blanc  
Emplacement : 28102.61.65

Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtémeant (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	18-3	19-3	3	5
2	4	18-3	21-3	6	15
3	7	18-3	25-3	9	13
4	8	18-3	22-3	13	16
5	6	19-3	22-3	9	15
Moyenne	31		22.3.02	40	13

+8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtémeant (oiv 306)
27/05	31/05	6/06		29/7	1/08	8/8	3/09	

+6

+3

+2



Témoin

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur

Code cépage : 74

Code clone :

Nom cépage : Ugni blanc

Emplacement : 2R10.161-65

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

## Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	16.3	20.3	4	
2	3	20.3	23.3	4	
3	8	20.3	23.3	15	
4	8	20.3	23.3	7	
5	6	20.3	23.3	8	
Moyenne	29		22.3.01	38x10=380	13

+18

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/05	29/05	1/06		30/07	3/8	6/08	28/08	

+5

+4

+2



Temoir

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000  
Code cépage : 0076 Code clone : 13  
Nom cépage : Aign blanc  
Emplacement : 2 R 1016-65

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	28.3	31.3	5	
2	2		7.4	6	
3	8	7.4	11.4	11	
4	8	11.4	7.4	13	
5	8	7.4	11.4	16	
Moyenne	32		7.4.200	49	15

+21

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
9/5/05	5/6	9/6		31/07	7/08	16/08	26/9	

+7

+3

+6